

Písomná informácia pre používateľa

COLDREX MAXGRIP LEMON

1000 mg/10 mg/40 mg
prášok na perorálny roztok

paracetamol, fenylefrínium-chlorid, kyselina askorbová

Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

Vždy užívajte tento liek presne tak, ako je to uvedené v tejto písomnej informácii alebo ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik.

- Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.
- Ak potrebujete ďalšie informácie alebo radu, obráťte sa na svojho lekárnik.
- Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnik. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii. Pozri časť 4.
- Ak sa do 3 dní nebudete cítiť lepšie alebo sa budete cítiť horšie, musíte sa obrátiť na lekára.

V tejto písomnej informácii sa dozviete:

1. Čo je COLDREX MAXGRIP LEMON a na čo sa používa
2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete COLDREX MAXGRIP LEMON
3. Ako užívať COLDREX MAXGRIP LEMON
4. Možné vedľajšie účinky
5. Ako uchovávať COLDREX MAXGRIP LEMON
6. Obsah balenia a ďalšie informácie

1. Čo je COLDREX MAXGRIP LEMON a na čo sa používa

Tento liek obsahuje nasledujúce účinné látky:

- Paracetamol, ktorý je liekom proti bolesti (analgetikum), vrátane bolesti hlavy, svalov a kĺbov, bolesti v hrdle, a tiež znižuje teplotu pri horúčke (antipyretikum). V prípravku je paracetamol obsiahnutý v maximálnej dávke.
- Kyselina askorbová (vitamín C), ktorá pomáha nahradiť vitamín C, ku ktorého úbytku môže dôjsť v počiatočných štádiách prechladnutia a chrípky.
- Fenylefrínium-chlorid je dekongestívum (látka znižujúca prekrvenie nosovej sliznice), ktoré sa používa na zníženie opuchu nosovej sliznice, uvoľňuje upchatý nos a vedľajšie nosové dutiny, aby uľahčil dýchanie.

COLDREX MAXGRIP LEMON je určený na krátkodobú liečbu príznakov chrípky a akútnych zápalov dýchacích ciest, vrátane horúčky, bolesti hlavy, bolesti v hrdle, bolesti kĺbov a svalov, upchatého nosa, zápalu vedľajších nosových dutín a s ním spojenú bolesť a akútnej katarálnej nádchy.

COLDREX MAXGRIP LEMON je určený pre dospelých a dospievajúcich od 15 rokov s telesnou hmotnosťou nad 65 kg.

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete COLDREX MAXGRIP LEMON

Neužívajte COLDREX MAXGRIP LEMON ak:

- ste alergický na paracetamol, fenylefrínium-chlorid, kyselinu askorbovú (vitamín C) alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6).
- máte závažne vysoký krvný tlak (hypertenziu);
- máte závažne zvýšenú funkciu štítnej žľazy (hypertyreóza);
- máte zriedkavý nádor nadobličiek (feochromocytóm);
- máte glaukóm s uzavretým uhlom (vysoký tlak vo vnútri oka);
- máte závažnú poruchu funkcie pečene;
- máte akútnu hepatitídu;
- užívate alebo ste užívali počas posledných 14 dní antidepresíva nazývané inhibítory monoaminoxidázy (MAO);
- užívate tricyklické antidepresíva, ako je imipramín a amitriptylín;
- užívate beta-blokátory a ďalšie antihypertenzíva (lieky na zníženie krvného tlaku) vrátane debrizochínu, guanethidínu, reserpínu a metyldopy;
- užívate iné prípravky na prechladnutie, chrípku alebo dekongestíva obsahujúce sympatomimetické amíny (napr. fenylefrín).

Vzhľadom na obsah liečiv nesmú liek užívať deti a dospelí do 15 rokov.

Upozornenia a opatrenia

Predtým, ako začnete užívať COLDREX MAXGRIP LEMON, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnik, ak máte niektorý z nasledujúcich zdravotných problémov:

- poruchu funkcie obličiek, zlyhanie obličiek;
- miernu až stredne závažnú poruchu funkcie pečene;
- pravidelne konzumujete alkohol (chronický alkoholizmus);
- máte Gilbertov syndróm (dedičná porucha metabolizmu žlčového farbiva prejavujúca sa ako žltáčka);
- máte obehové poruchy ako je stav nazývaný Raynaudov fenomén, ktorý je dôsledkom zlého krvného obehu v prstoch na rukách a nohách;
- užívate lieky, ktoré ovplyvňujú funkciu pečene;
- máte nedostatok enzýmu glukóza-6-fosfát dehydrogenázy alebo nedostatok glutatiónu (antioxidant tvoriaci sa v tele a odvádzajúci škodlivé látky z tela);
- máte poruchu, ktorá spôsobuje, že červené krvinky sú ničené rýchlejšie, než je rýchlosť ich tvorby (hemolytická anémia);
- trpíte dehydratáciou;
- trpíte chronickou podvýživou;
- vážite menej ako 65 kg;
- máte problémy s močením, prejavujúce sa zadržiavaním moču alebo zväčšenú prostatu;
- máte astmu a ste citlivý na kyselinu acetylsalicylovú.

Počas užívania tohto lieku nepoužívajte žiadny iný prípravok s obsahom paracetamolu.

Vzhľadom na riziko nezvratného poškodenia pečene je potrebné v prípade predávkovania vyhľadať okamžitú lekársku pomoc, aj keď sa pacient cíti dobre.

Deti a dospelí

Nepodávajú tento liek deťom a dospelým do 15 rokov.

Iné lieky a COLDREX MAXGRIP LEMON

Ak teraz užívate alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

Počas užívania tohto lieku neužívajte žiadny iný prípravok s obsahom paracetamolu a dekongestíva (lieku na zníženie opuchu nosnej sliznice).

Predtým, ako začnete užívať COLDREX MAXGRIP LEMON, je potrebné sa poradiť s lekárom, ak užívate niektorý z nasledujúcich liekov:

- probenecid, ktorý sa bežne používa na liečbu dny;
- lieky na liečbu vysokej hladiny cholesterolu v krvi, ako je kolestýramín;
- lieky na liečbu nevoľnosti a vracanie, ako je metoklopramid alebo domperidón;
- lieky na zníženie zrážanlivosti krvi, napr. warfarín;
- antibiotikum chloramfenikol;
- zidivudín, liek používaný na liečbu infekcií HIV a AIDS;
- lieky na liečbu tuberkulózy, ako je izoniazid alebo rifampicín;
- lieky na liečbu epilepsie, ako je fenobarbital alebo lamotrigín;
- kyselina acetylsalicylová alebo iné nesteroidné protizápalové lieky;
- lieky na liečbu srdcových alebo obehových ťažkostí alebo na zníženie krvného tlaku, ako je digoxín;
- lieky na liečbu migrény, ako je ergotamín a metysergid;
- ďalšie prípravky, ktoré ovplyvňujú funkciu pečene;
- flukloxacilín (antibiotikum) z dôvodu závažného rizika abnormalít krvi a tekutín (metabolická acidóza s vysokou aniónovou medzerou), ktorá sa musí urýchlene liečiť, a ktorá sa môže vyskytnúť najmä v prípade ťažkej poruchy funkcie obličiek, sepsy (keď baktérie a ich toxíny kolujúce v krvi vedú k poškodeniu orgánov), podvýživy, chronického alkoholizmu a ak sa užívajú maximálne denné dávky paracetamolu.

COLDREX MAXGRIP LEMON a jedlo, nápoje a alkohol

Počas užívania COLDREX MAXGRIP LEMON sa nesmie konzumovať alkohol. Dlhodobá konzumácia alkoholu významne zvyšuje riziko poškodenia pečene. Ak máte problémy s pitím alkoholu, pred začiatkom liečby sa poraďte s lekárom. Liek sa môže podávať nezávisle od jedla.

Tehotenstvo a dojčenie

Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojim lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete užívať tento liek.

Liek nie je vhodné užívať počas tehotenstva a dojčenia. Dojčiace ženy môžu liek užívať len na odporúčenie lekára.

Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Liečivá v COLDREX MAXGRIP LEMON nespôsobujú ospalosť.

COLDREX MAXGRIP LEMON môže spôsobovať závraty. Ak vám liek spôsobuje závraty, nesmiete viesť vozidlá alebo obsluhovať stroje.

COLDREX MAXGRIP LEMON obsahuje sodík, glukózu a sacharózu

Tento liek obsahuje 116 mg sodíka (hlavná zložka kuchynskej/stolovej soli) v jednom vrecku. To sa rovná 6 % odporúčaného maximálneho denného príjmu sodíka v potrave pre dospelú osobu.

Liek obsahuje 3725 mg sacharózy a 6,65 mg glukózy v jednom vrecku. To je potrebné vziať do úvahy u pacientov s cukrovkou. Ak vám váš lekár povedal, že neznášate niektoré cukry, kontaktujte svojho lekára pred užitím tohto lieku.

3. Ako užívať COLDREX MAXGRIP LEMON

Vždy užívajte tento liek presne tak, ako je to uvedené v tejto písomnej informácii alebo ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik. Ak si nie ste ničím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.

Odporúčaná dávka

Dospelí a dospelievajúci od 15 rokov s telesnou hmotnosťou nad 65 kg:

1 vrečko každých 4-6 hodín, podľa potreby.

Medzi dávkami je potrebné dodržiavať **minimálny interval 4 hodiny**.

Maximálna jednotlivá dávka je 1 vrečko. Neužíva sa viac ako 4 vrecká počas 24 hodín. Neprekračujte odporúčané dávkovanie.

Deti a dospelievajúci mladší ako 15 rokov

Tento liek nie je určený pre deti a dospelievajúcich mladších ako 15 rokov.

Spôsob podávania

Liek je určený na perorálne podanie (podanie ústami).

Obsah 1 vrecka vysypte do pohára alebo šálky a zalejte horúcou vodou (približne 125 ml). Dobre premiešajte, kým sa prášok nerozpustí. V prípade potreby pridajte studenú vodu, podľa chuti môžete prisladiť medom alebo cukrom a teplý roztok vypite.

Užívanie vyšších než odporúčených dávok môže viesť k riziku závažného poškodenia pečene.

Ak nedôjde do 3 dní k zlepšeniu príznakov ochorenia alebo sa naopak ťažkosti zhoršia, vyskytnú sa nové príznaky alebo neobvyklé reakcie, poraďte sa o ďalšej liečbe s lekárom.

Bez porady s lekárom neužívajte tento liek dlhšie ako 7 dní.

Ak užijete viac COLDREX MAXGRIP LEMON, ako máte

Vo všetkých prípadoch podozrenia na predávkovanie alebo náhodné požitie lieku dieťaťom ihneď vyhľadajte lekára alebo najbližšie zdravotnícke zariadenie. Ukážte im použité balenie a túto písomnú informáciu. Predávkovanie paracetamolom môže spôsobiť vážne poškodenie až zlyhanie funkcie pečene. V prípade predávkovania je nevyhnutná okamžitá lekárska pomoc, aj keď nie sú prítomné žiadne príznaky predávkovania. Počiatočné príznaky predávkovania môžu zahŕňať bledú pokožku, nevoľnosť, vracanie a bolesti brucha.

Ak zabudnete užiť COLDREX MAXGRIP LEMON

Užite jednu dávku, ako si spomeniete. Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku. Neužívajte viac ako 1 dávku počas 4 hodín.

Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnik.

4. Možné vedľajšie účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavujú u každého.

Ak sa u Vás vyskytnú niektoré z nasledujúcich nežiaducich účinkov alebo sa stane niečo neobvyklé, **okamžite prestaňte liek užívať a poraďte sa s lekárom alebo lekárnikom.**

Pri užívaní COLDREX MAXGRIP LEMON sa môžu vyskytnúť nasledujúce vedľajšie účinky (zoradené podľa frekvencie výskytu):

Zriedkavé (môžu postihovať menej ako 1 z 1000 osôb):

- Alergické reakcie (sprevádzané svrbením, výsypom – urtikária, alergická dermatitída), anafylaktický šok (prudká a závažná alergická reakcia);
- Zmeny v krvi, ktoré môžu zvýšiť náchylnosť na krvácanie (poruchy krvných doštičiek), poruchy kmeňových buniek;

- Problémy s dýchaním, ktoré sú pravdepodobnejšie, ak ste ich už predtým mali pri užívaní iných liekov proti bolesti, ako je aspirín (kyselina acetylsalicylová) alebo iných nesteroidných protizápalových liekov ako napr. ibuprofén;
- Bolesť brucha;
- Hnačka;
- Nevoľnosť (pocit na vracanie);
- Vracanie;
- Zvýšený tlak vo vnútri oka (glaukóm s uzavretým uhlom);
- Rozšírené zrenice;
- Opuch;
- Porucha funkcie pečene, zlyhanie pečene, žltacka, nekróza pečene;
- Vyrážka, začervenanie pokožky, potenie;
- Problémy s močením, sťažené močenie alebo zadržiavanie moču (najmä u pacientov s problémami odtoku moču vzhľadom na iné ochorenie napr. zväčšenie prostaty);
- Predávkovanie a otrava.

Veľmi zriedkavé (môžu postihovať menej ako 1 z 10000 osôb):

- Závažné kožné reakcie z precitlivenosti vrátane vyrážky, svrbenia, opuchu a začervenania oblastí kože, niekedy s dýchavičnosťou alebo opuchom úst, pier, jazyka, hrdla alebo tváre, pľuzgiermi a odlupovaním kože sprevádzanej postihnutím slizníc.

Neznáme (častotť sa nedá odhadnúť z dostupných údajov):

- Zvýšený krvný tlak, palpitácie (búšenie srdca), zrýchlená srdcová činnosť;
- Ťažkosti so spánkom (nespavosť);
- Nervozita;
- Bolesť hlavy;
- Závrat.

Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára, alebo lekárnik. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo na **národné centrum hlásenia uvedené v Prílohe V**. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.

5. Ako uchovávať COLDREX MAXGRIP LEMON

Tento liek uchovávajúte mimo dohľadu a dosahu detí.
Uchovávajúte pri teplote do 25 °C.

Nepoužívajte tento liek po dátume expirácie, ktorý je uvedený na škatuľke po EXP. Dátum expirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.

Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.

6. Obsah balenia a ďalšie informácie

Čo COLDREX MAXGRIP LEMON obsahuje

- Liečivá sú paracetamol 1000 mg, fenylefrínium-chlorid 10 mg, kyselina askorbová (vitamín C) 40 mg.

Schválený text k rozhodnutiu o zmene, ev. č.: 2018/01417-ZME

Schválený text k rozhodnutiu o zmene, ev. č.: 2022/01145-ZME

- Ďalšie zložky sú kyselina citrónová, citrónan sodný, kukuričný škrob, cyklamát sodný, sacharóza, sodná soľ sacharínu, citrónová príchuť PHS-163671, bezvodý koloidný oxid kremičitý, kurkumín 5% (obsahuje glukózu).

Ako vyzerá COLDREX MAXGRIP LEMON a obsah balenia

COLDREX MAXGRIP LEMON je svetložltý prášok s citrónovou príchuťou na prípravu perorálneho roztoku.

K dispozícii je v jednodávkových vreckách. Jedno vrecko obsahuje 6,4 g prášku.

Veľkosť balenia: 1, 3, 5, 6, 8, 10, 12 alebo 14 vreciek v škatuľke.

Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.

Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca

Držiteľ rozhodnutia o registrácii

OMEGA PHARMA a.s., Vídeňská 188/119d, 619 00 Brno – Dolní Heršpice, Česká republika

Výrobca

Omega Pharma International NV, Venecoweg 26, Nazareth, 9810, Belgicko

Táto písomná informácia bola naposledy aktualizovaná vo februári 2023.